


Procedimiento con Equipo de Protección Personal (EPP) para Evaluación de Px Sintomático (PxSx)

1.



PxSx pasa al centro del consultorio asignado

Solicite al paciente pasar al área de revisión para su atención, con la puerta abierta (así debe permanecer todo el tiempo), **sin que toque ninguna superficie y que se quede de pie en el centro de la habitación**. Si el paciente viene en silla de ruedas deberá pasar a la habitación preferentemente en su propia silla de ruedas ó en aquella designada para el área de evaluación.

2.



Higiene de manos, no accesorios (pulseras, etc.)

Realice la higiene de manos con alcohol gel o con agua y jabón de acuerdo a la técnica adecuada lavando hasta los codos. Asegúrese de no traer pulseras, reloj, anillos u otros accesorios.

1

2

5

4.



Evaluación del Px

- 1.- Interrogatorio - A 2mts de distancia.
- 2.- Exploración física:
 - 2.1- Estado de conciencia
 - 2.2 - Coloración y edema
 - 2.3 - Auscultación de tórax
 - 2.4 - Toma de presión arterial
 - 2.5 - Saturación de oxígeno
 - 2.6 - Toma de temperatura
- 3.- Toma de anotaciones en la pizarra.

3.



Colocación de EPP en el siguiente orden:

- 1.-Mascarilla
- 2.-Googles y Gorro
- 3.-Botas
- 4.-Bata amarrada
- 5.-Guantes

4

5.



Limpieza de sala y equipo

Sin retirarse el equipo de protección, utilice la solución de cloro para limpiar el equipo de evaluación.

6.




Se retira y desecha EPP (menos mascarilla y googles) en el siguiente orden:

- 1.-Botas o cubre-zapatos
- 2.-Guantes (doblándolos sobre sí mismos)
- 3.-Gorro
- 4.-Bata (sin tocar la cara externa, dóblela y deséchela)
- 5.-No se retire la mascarilla. Realice higiene de manos.

3

Procedimiento de EPP y Tratamiento de Paciente Sintomático (PxSx)

1.



PxSx pasa al área de tx, cierre la puerta

2.



Higiene de manos, no accesorios (pulseras, etc.)


3.



Colocación de EPP en el siguiente orden:

- 1.-Mascarilla
- 2.-Googles y Gorro
- 3.-Botas
- 4.-Bata amarrada
- 5.-Guantes

5.



Conexión

Haga **higiene de manos sobre los guantes** y **calze guantes estériles sobre previos**. Al terminar, retire guantes de conexión y realice higiene sobre los otros en cada uno de los 5 momentos.

4.



Evaluación del PxSx

Peso de paciente en báscula portátil* y programación de sesión.


6.



Salida/Re-ingreso

Si tiene que salir, seguir protocolo de entrada y salida del área del tx

7.



Desconexión

Calze guantes estériles sobre previos, peso de paciente en báscula portátil* y egrese paciente con apoyo.

9.



Se retira y desecha EPP (menos mascarilla y googles) en el siguiente orden:

- 1.-Botas o cubre-zapatos
- 2.-Guantes (doblándolos sobre sí mismos)
- 3.-Gorro
- 4.-Bata (sin tocar la cara externa, dóblela y deséchela)
- 5.-No se retire la mascarilla. Realice higiene de manos.


8.



Limpieza de sala y equipo

Sin retirarse el equipo de protección, Exhaustivo de la máquina y equipo médico se deja 2 hrs sin uso entre Px y Px.

3



AL SALIR

1.- Abra la puerta

2.- Retire y deseche en el siguiente orden:

1



**Botas o
cubre-zapatos**

2



Guantes
(doblándolos sobre
sí mismos)

3



Gorro

3.-Retire bata sin tocar cara externa

4.-



Cuelgue la bata
con la cara externa al Px


5.- No se retira mascarilla ni googles

6.-



**Higiene
de manos**

7.-




**Salga y cierre
la puerta**

8.-



**Higiene
de manos**




AL RE-INGRESAR

1.-



Higiene de manos

2.-



Abra la puerta

3.-



Colóquese las botas o cubre-zapatos

4.-



Higiene de manos

5.-Colóquese lo siguiente en este orden:

1



Gorro

2



Guantes no estériles

6.-



Use la bata colgada desde la cara interna.

7.-



Calze nuevos guantes sobre los 1^{os}

8.-



Higiene de manos sobre los guantes en cada uno de los 5 momentos.

9.-



Conexión/Desconexión
Calze nuevos guantes estériles sobre el actual para de guantes.
Si, son 3 pares de guantes en total.